

ABSTRAK

LINA MARLINA. Hubungan Karakteristik Ibu dengan Kejadian Komplikasi Masa Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Cipatujah Tahun 2026

Komplikasi masa nifas merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu yang masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia. Berbagai karakteristik ibu diduga memengaruhi terjadinya komplikasi pada masa nifas sehingga diperlukan identifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik ibu dengan kejadian komplikasi masa nifas di wilayah kerja Puskesmas Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026. Penelitian menggunakan desain kuantitatif analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 92 ibu nifas yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 28,3% responden mengalami komplikasi masa nifas. Uji bivariat menunjukkan bahwa usia ($p=0,001$), paritas ($p=0,004$), pendidikan ($p=0,031$), status anemia ($p<0,001$), dan riwayat penyakit ($p=0,001$) berhubungan signifikan dengan kejadian komplikasi masa nifas, sedangkan pekerjaan tidak berhubungan ($p=0,307$). Disimpulkan bahwa karakteristik ibu, khususnya usia, paritas, pendidikan, status anemia, dan riwayat penyakit merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian komplikasi masa nifas. Tenaga kesehatan diharapkan meningkatkan deteksi dini dan pemantauan ibu yang memiliki faktor risiko untuk mencegah terjadinya komplikasi.

Kata kunci: *karakteristik ibu, komplikasi masa nifas, usia, anemia, paritas.*

ABSTRACT

LINA MARLINA. The Relationship between Maternal Characteristics and Postpartum Complications in the Working Area of Cipatujah Primary Health Center, 2026

Postpartum complications remain one of the leading causes of maternal morbidity and mortality in Indonesia. Maternal characteristics are considered important factors influencing the occurrence of postpartum complications; therefore, identifying associated risk factors is essential. This study aimed to analyze the relationship between maternal characteristics and postpartum complications in the working area of the Cipatujah Primary Health Center, Tasikmalaya Regency, in 2026. An analytical quantitative study with a cross-sectional design was conducted involving 92 postpartum mothers selected through simple random sampling. Data were analyzed using univariate analysis and the Chi-square test with a significance level of 5%. The results showed that 28.3% of respondents experienced postpartum complications. Bivariate analysis indicated significant relationships between maternal age ($p=0.001$), parity ($p=0.004$), educational level ($p=0.031$), anemia status ($p<0.001$), and history of disease ($p=0.001$) with postpartum complications. However, maternal occupation was not significantly associated with postpartum complications ($p=0.307$). It can be concluded that maternal age, parity, educational level, anemia status, and history of disease are significantly associated with postpartum complications. Health professionals are encouraged to strengthen early risk detection and monitoring of postpartum mothers with these risk factors to reduce the incidence of postpartum complications.

Keywords: *maternal characteristics, postpartum complications, maternal age, anemia, parity.*