

Program Studi Keperawatan Program Sarjana
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Galuh Ciamis
Skripsi, Maret 2024

Tri Haryanto
triharyanto7255@gmail.com

ABSTRAK

FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI INTRADIALITIK (HID) PADA PASIEN HEMODIALISIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG 2024

Penyakit ginjal merupakan salah satu penyebab utama dari kematian dan kecacatan di sebagian besar negara di seluruh dunia. Peningkatan tekanan darah selama hemodialisis, dikenal dengan hipertensi intradialitik (HID) telah diketahui sejak beberapa dekade sebelumnya, namun fenomena ini seringkali diabaikan dan fokus terutama hanya pada hipotensi intradialitik dan komplikasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan dengan kejadian hipertensi intradialitik pada pasien Hemodialisis. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif korelatif dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi adalah pasien hemodialisis RSUD Majenang dengan sampel sebanyak 60 responden. Uji korelasi menggunakan *Chi Square*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami kejadian hipertensi intradialitik (61,7%). Tidak ada hubungan umur dengan kejadian hipertensi intradialitik (HID) dengan p-value 0.211 (>0.05). Tidak ada hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi intradialitik (HID) dengan p-value 0.500 (>0.05). Tidak ada hubungan status nutrisi dengan kejadian hipertensi intradialitik (HID) dengan p-value 0.175 (>0.05). Ada hubungan ultrafiltrasi dengan kejadian hipertensi intradialitik (HID) dengan p-value 0.001 (>0.05). Kesimpulan, tidak ada hubungan antara umur, jenis kelamin, dan status nutrisi dengan kejadian hipertensi intradialitik (HID). Ada hubungan antara ultrafiltrasi dengan kejadian hipertensi intradialitik (HID) di RSUD Majenang.

Kata Kunci;

Hemodialisis, Hipertensi intradialitik, HID
Referensi : Daftra Pustaka (2016 s/d 2013)

*Nursing Study Program Undergraduate Program
Faculty of Health Sciences
Galuh Ciamis University
Thesis, March 2024*

Tri Haryanto
triharyanto7255@gmail.com

ABSTRACT

FACTORS ASSOCIATED WITH THE INCIDENT OF INTRADIALYTIC HYPERTENSION (HID) IN HEMODIALYSIS PATIENTS AT THE MAJENANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL 2024

Kidney disease is one of the main causes of death and disability in most countries around the world. An increase in blood pressure during hemodialysis, known as intradialytic hypertension (HID), has been known for several decades, but this phenomenon is often ignored and the focus is mainly on intradialytic hypotension and its complications. This study aims to analyze the factors associated with the incidence of intradialytic hypertension. in hemodialysis patients. This research uses a correlative descriptive method with a cross sectional approach. The population is hemodialysis patients at Majenang Regional Hospital with a sample of 60 respondents. Correlation test using Chi Square. The results of this study showed that the majority of respondents experienced intradialytic hypertension (61.7%). There is no relationship between age and the incidence of intradialytic hypertension (HID) with a p-value of 0.211. There is no relationship between gender and the incidence of intradialytic hypertension (HID) with a p-value of 0.500. There is no relationship between nutritional status and the incidence of intradialytic hypertension (HID) with a p-value of 0.175. There is a relationship between ultrafiltration and the incidence of intradialytic hypertension (HID) with a p-value of 0.001. In conclusion, there is no relationship between age, gender and nutritional status and the incidence of intradialytic hypertension (HID). There is a relationship between ultrafiltration and the incidence of intradialytic hypertension (HID) at Majenang Regional Hospital..

Key Words;

Hemodialysis, HID, Intradialytic hypertension

Reference: Bibliography List (2016 to 2013)